

¿Es la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas es una infección transmitida por un insecto conocido como triatomino (vinchuca, chinche hocicona). **Infórmese sobre los riesgos de la enfermedad y cómo LAMPIT® (nifurtimox) puede ser de ayuda.**



LAMPIT es el único tratamiento aprobado por la FDA para la enfermedad de Chagas, causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*, para niños de todas las edades, desde el nacimiento hasta menores de 18 años, que pesen al menos 5.5 libras (2.5 kg).

¿Qué es LAMPIT?

LAMPIT® es un medicamento de venta con receta utilizado para tratar la enfermedad de Chagas, causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*, en niños menores de 18 años que pesen al menos 5.5 libras (2.5 kg). Se desconoce si LAMPIT es seguro y eficaz en niños que pesan menos de 5.5 libras (2.5 kg).

Información importante de seguridad

No tome LAMPIT en comprimidos en los siguientes casos:

- Si es alérgico al nifurtimox o a cualquiera de los componentes de LAMPIT.
- Si planea beber alcohol durante el tratamiento con LAMPIT.


Consulte la Información importante de seguridad incluida en este folleto y la [Información para prescribir completa](#).

Lampit®
(nifurtimox) comprimidos
30 mg • 120 mg

La enfermedad de Chagas es provocada por una infección y puede ser grave si no se trata

La enfermedad de Chagas es causada por un parásito llamado *Trypanosoma cruzi*, que es transmitido a los humanos por insectos conocidos como "triatominos" (vinchuca, chinche hocicona).

Unas **300,000** personas en Estados Unidos pueden estar infectadas con la enfermedad de Chagas.



¿Cómo se transmite?

Aunque la enfermedad de Chagas se transmite **con mayor frecuencia a las personas a través de los triatominos (vinchuca, chinche hocicona)**, también puede transmitirse:

- De madres embarazadas a sus bebés en gestación
- A través de trasplantes de órganos o transfusiones de sangre
- Al ingerir alimentos contaminados

¿Quién corre el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas?

Las personas que viven en una zona donde la enfermedad de Chagas es frecuente corren el riesgo de contraerla.


Los bebés cuyas madres contrajeron la infección durante el embarazo corren riesgo de contraer la enfermedad de Chagas y deben someterse a pruebas después de nacer.

¿Cuáles son algunos de los síntomas de la enfermedad de Chagas?

Poco después de infectarse, las personas pueden presentar síntomas de leves a moderados, como los siguientes:



Fiebre



Dolores corporales



Cansancio



Hinchazón alrededor de la picadura

Los niños a veces presentan hinchazón de los párpados en el lado de la cara donde produjo la picadura. Aunque estos síntomas pueden desaparecer al cabo de unas semanas, la infección puede permanecer durante años, lo que puede provocar problemas graves.



¿Cómo se diagnostica y trata la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas puede **diagnosticarse mediante análisis de sangre** y tratarse con medicamentos.



Es importante diagnosticar y tratar la enfermedad de Chagas a tiempo. Las personas pueden desarrollar una infección de por vida que causa graves daños en el corazón y el intestino. Si cree que su hijo puede correr el riesgo de contraer la enfermedad, hable con su médico sobre las pruebas y los medicamentos para tratar la infección.

LAMPIT® (nifurtimox) es un medicamento aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Chagas:

LAMPIT es el único tratamiento aprobado por la FDA para la enfermedad de Chagas, causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*, para niños de todas las edades, desde el nacimiento hasta menores de 18 años, que pesen al menos 5.5 libras (2.5 kg).

- Si a su hijo le han diagnosticado la enfermedad de Chagas, pregúntele a su médico acerca de LAMPIT.
- Se recomienda el tratamiento precoz de la enfermedad de Chagas.



Cómo tomar LAMPIT

LAMPIT es un comprimido que se toma 3 veces al día, con alimentos. Su médico determinará la dosis en función del peso del niño.

Es importante tomar LAMPIT de acuerdo con las instrucciones.

Consulte las Instrucciones de uso detalladas en la Información para prescribir.

Puede encontrar más información sobre cómo tomar LAMPIT [aquí](#).

Información importante de seguridad (cont.)

Antes de tomar LAMPIT, informe a su médico todos sus problemas de salud, entre ellos los siguientes:

- Si tiene antecedentes de lesiones cerebrales, convulsiones, problemas de salud mental o cambios de comportamiento.
- Si tiene problemas renales o recibe diálisis.
- Si tiene problemas hepáticos.
- Si tiene un problema genético llamado porfiria. Tomar LAMPIT puede hacer que empeoren sus síntomas de porfiria, entre ellos, orina turbia, dolor de estómago intenso, dolor muscular, hormigueo, embotamiento, cambios mentales o fotosensibilidad de la piel.
- Si está embarazada, lo tiene previsto o cree que puede estar embarazada. LAMPIT puede dañar al bebé en gestación.

Consulte la Información importante de seguridad incluida en este folleto y la [Información para prescribir completa](#).

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de LAMPIT?

Los efectos secundarios más frecuentes de LAMPIT incluyen:

- Vómitos
- Dolor abdominal
- Cefalea
- Disminución del apetito
- Náuseas
- Fiebre
- Exantema

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LAMPIT. Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) llamando al 1-800-FDA-1088.

Para obtener más información sobre la enfermedad de Chagas y LAMPIT, visite LAMPIT.com.

Información importante de seguridad (cont.)

Para mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su médico debe realizarle una prueba de embarazo antes de que empiece a tomar LAMPIT para asegurarse de que no está embarazada.
- **Debe utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con LAMPIT y durante 6 meses después de la dosis final de LAMPIT.** Consulte a su médico sobre los métodos anticonceptivos que puedan ser apropiados para usted.
- Llame a su médico de inmediato si queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento con LAMPIT.

Para hombres:

- LAMPIT puede provocar problemas de fertilidad en los hombres. Esto puede afectar a su capacidad de tener hijos. Hable con su médico si tiene dudas sobre la fertilidad.
- **Debe utilizar un preservativo con sus parejas de sexo femenino que puedan quedar embarazadas, durante el tratamiento con LAMPIT y durante 3 meses después de la dosis final de LAMPIT.**
- Si está amamantando o tiene planes de hacerlo. LAMPIT puede pasar a la leche materna y producir daños a su bebé. Consulte a su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con LAMPIT. Si toma LAMPIT y amamanta, controle si su bebé presenta vómitos, erupción cutánea, disminución del apetito, fiebre e irritabilidad.

Informe a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Programas que pueden ayudarlo con el costo del tratamiento con LAMPIT® (nifurtimox)

Bayer se compromete a ayudar a las personas con enfermedad de Chagas a quienes se les receta LAMPIT a recibir el tratamiento que necesitan. Bayer entiende que, a veces, las personas tienen dificultades financieras. Por tal motivo, hemos desarrollado un programa de ayuda para aquellos que reúnen los requisitos.

Este es un programa que puede servir de ayuda.



The Bayer US Patient Assistance Foundation (Fundación de Asistencia a Pacientes de Bayer US)

- Los pacientes sin seguro médico que no puedan pagar el tratamiento con LAMPIT pueden acudir a la Fundación de Asistencia a Pacientes de Bayer US, una institución benéfica que puede ayudar a los pacientes elegibles a conseguir LAMPIT sin costo alguno
- Para obtener más información, visite la página web de la fundación en PatientAssistance.Bayer.us

Información importante de seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LAMPIT?

LAMPIT puede producir efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Agravamiento de los síntomas relacionados con lesiones cerebrales, convulsiones, problemas de salud mental o cambios de comportamiento en personas con antecedentes de estos problemas.** Llame inmediatamente a su médico si alguno de estos problemas se agrava durante el tratamiento con LAMPIT.
- **Reacciones alérgicas.** Pueden producirse reacciones alérgicas al tomar nifurtimox, el principio activo de LAMPIT, o con los cambios en su sistema inmunológico causados por la enfermedad de Chagas durante el tratamiento con LAMPIT. Estas reacciones alérgicas pueden incluir presión arterial baja, hinchazón de la cara y la lengua (angioedema), dificultad para respirar, picazón, erupción cutánea u otros problemas de la piel. Llame a su médico o solicite asistencia médica urgente si presenta alguno de estos signos y síntomas de reacción alérgica durante el tratamiento con LAMPIT.

Consulte la Información importante de seguridad incluida en este folleto y la [Información para prescribir completa](#).

Información importante de seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LAMPIT? (cont.)

LAMPIT puede producir efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Pérdida de apetito y pérdida de peso.** Su médico debe controlar su peso cada 14 días para ver si es necesario modificar su dosis de LAMPIT.

Los efectos secundarios más frecuentes de LAMPIT son: vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, disminución del apetito, náuseas, fiebre y erupción cutánea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LAMPIT. Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Si su hijo padece la enfermedad de Chagas, LAMPIT® (nifurtimox) puede ayudarlo

- **LAMPIT es el único tratamiento aprobado por la FDA para la enfermedad de Chagas**, causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*, para niños de todas las edades, desde el nacimiento hasta menores de 18 años, que pesen al menos 5.5 libras (2.5 kg)



Bayer ofrece un programa que puede ayudar con los costos y el acceso a LAMPIT a los pacientes elegibles

- Para conocer más detalles del programa, visite PatientAssistance.Bayer.us

Hable con su médico si cree que su hijo está en riesgo de padecer la enfermedad de Chagas o podría estarlo, y para averiguar si LAMPIT es el tratamiento adecuado.

Para obtener más información sobre la enfermedad de Chagas y LAMPIT, visite LAMPIT.com.

Información importante de seguridad

No tome LAMPIT en comprimidos en los siguientes casos:

- Si es alérgico al nifurtimox o a cualquiera de los componentes de LAMPIT.
- Si planea beber alcohol durante el tratamiento con LAMPIT.

Consulte la Información importante de seguridad incluida en este folleto y la [Información para prescribir completa](#).



BAYER, la Cruz de Bayer y LAMPIT son marcas comerciales registradas de Bayer.
© 2023 Bayer Todos los derechos reservados. 07/2023 PP-LAM-US-0059-1

Lampit®
(nifurtimox) comprimidos
30 mg • 120 mg